

IBUPROFEN DOSAGE TABLE (FOR FEVER AND PAIN)

Child's Weight (pounds)	12-17	18-23	24-35	36-47	48-59	60-71	72-95	96+	lbs
Liquid 100 mg/ 5 milliliters (ml)	2.5	4	5	7.5	10	12.5	15	20	ml
Chewable 50 mg. tablets	--	--	2	3	4	5	6	8	tabs
Junior-strength 100 mg tablets	--	--	--	--	2	2 1/2	3	4	tabs
Adult 200 mg. tablets	--	--	--	--	1	1	1 1/2	2	tabs

Indications: Treatment of fever and pain.

Table Notes:

- **AGE LIMIT:** Don't use under 6 months of age unless directed by child's doctor. (Reason: safety not established and doesn't have FDA approval). Avoid multi-ingredient products in children under 6 years of age (FDA recommendations 1/2008).
- **DOSAGE:** Determine by finding child's weight in the top row of the dosage table.
- **MEASURING the DOSAGE:** Syringes and droppers are more accurate than teaspoons. If possible, use the syringe or dropper that comes with the medication. If you use a teaspoon, it should be a measuring spoon. Regular spoons are not reliable. Also, remember that 1 level teaspoon equals 5 ml and that 1/2 teaspoon equals 2.5 ml.
- **IBUPROFEN DROPS:** Ibuprofen infant drops come with a measuring syringe.
- **BRAND NAMES:** Motrin, Advil, generic ibuprofen.
- **ADULT DOSAGE:** 400 mg.
- **FREQUENCY:** Repeat every 6 to 8 hours as needed.

ACETAMINOPHEN DOSAGE TABLE (FOR FEVER AND PAIN)

Child's Weight (pounds)	6-11	12-17	18-23	24-35	36-47	48-59	60-71	72-95	96+	bs
Syrup: 160 mg/5 mL (1 tsp)	1.25	2.5	3.75	5	7.5	10	12.5	15	20	ml
Chewable 80 mg Tablets	--	--	1 1/2	2	3	4	5	6	8	tabs
Chewable 160 mg Tablets	--	--	--	1	1 1/2	2	2 1/2	3	4	tabs
Adult 325 mg Tablets	--	--	--	--	--	1	1	1 1/2	2	tabs
Adult 500 mg Tablets	--	--	--	--	--	--	--	1	1	tabs

Indications: Treatment of fever and pain.

Table Notes:

- **AGE LIMIT:** Don't use under 12 weeks of age (Reason: fever during the first 12 weeks of life needs to be documented in a medical setting and if present, your infant needs a complete evaluation.) **EXCEPTION:** Fever from immunization if child is 8 weeks of age or older. Avoid multi-ingredient products in children under 6 years of age. (Reason: FDA recommendations 1/2008).
- **DOSAGE:** Determine by finding child's weight in the top row of the dosage table.
- **MEASURING the DOSAGE:** Syringes and droppers are more accurate than teaspoons. If possible, use the syringe or dropper that comes with the medicine. If not, medicine syringes are available at pharmacies. If you use a teaspoon, it should be a measuring spoon. Regular spoons are not reliable. Also, remember that 1 level teaspoon equals 5 ml and that 1/2 teaspoon equals 2.5 ml.
- **FREQUENCY:** Repeat every 4-6 hours as needed. Don't give more than 5 times a day.
- **ADULT DOSAGE:** 650 mg **MAXIMUM:** 3,000 mg in a 24-hour period.
- **BRAND NAMES:** Tylenol, Feverall (suppositories), generic acetaminophen.
- **MELTAWAYS:** Dissolvable tabs that come in 80 mg and 160 mg (jr. strength).
- **SUPPOSITORIES:** Acetaminophen also comes in 80, 120, 325 and 650 mg suppositories (the rectal dose is the same as the dosage given by mouth).
- **EXTENDED-RELEASE:** Avoid 650 mg oral products in children (Reason: they are every 8 hour extended-release).

CUADRO DE DOSIFICACIÓN DE IBUPROFENO (PARA LA FIEBRE Y EL DOLOR)

Peso del niño (en libras)	12-17	18-23	24-35	36-47	48-59	60-71	72-95	96+	lbs
Líquido 100 mg/ 5 mililitros (ml)	2.5	4	5	7.5	10	12.5	15	20	ml
Comprimidos masticables de 50 mg	--	--	2	3	4	5	6	8	comp.
Comprimidos de 100 mg juveniles	--	--	--	--	2	2 1/2	3	4	comp.
Comprimidos de 200 mg para adultos	--	--	--	--	1	1	1 1/2	2	comp.

Indicaciones: Tratamiento de fiebre y dolor.

Notas del cuadro:

- **LÍMITE DE EDAD:** No debe usarse para niños menores de 6 meses de edad a menos que lo indique el médico del niño. (Motivo: no se ha establecido el nivel de seguridad y no cuenta con la aprobación de la FDA). No use fármacos con varios ingredientes con niños menores de 6 años de edad (recomendaciones de 1/2008 de la FDA).
- **DOSIFICACIÓN:** Se determina en base al peso del niño que aparece en la fila superior del cuadro con las dosis.
- **MEDICIÓN DE LAS DOSIS:** Las jeringas y los goteros son más precisos que las cucharaditas. Si es posible, use la jeringa o gotero que viene con el medicamento. Si usa una cucharita, debe ser una cuchara medidora. Las cucharas comunes no son confiables. Además, recuerde que 1 cucharadita equivale a 5 ml y que 1/2 cucharadita equivale a 2.5 ml.
- **GOTAS DE IBUPROFENO:** Las gotas de ibuprofeno para bebés vienen con una jeringa medidora.
- **MARCAS:** Motrin, Advil, ibuprofeno genérico.
- **DOSIFICACIÓN PARA ADULTOS:** 400 mg.
- **FRECUENCIA:** Repetir cada 6 a 8 horas según sea necesario.

CUADRO DE DOSIFICACIÓN DE ACETAMINOFÉN (PARA LA FIEBRE Y EL DOLOR)

Peso del niño (en libras)	6-11	12-17	18-23	24-35	36-47	48-59	60-71	72-95	96+	bs
Jarabe: 160 mg/5 mL (1 cda.)	1.25	2.5	3.75	5	7.5	10	12.5	15	20	ml
Comprimidos masticables de 80 mg	--	--	1 1/2	2	3	4	5	6	8	tabs
Comprimidos masticables de 160 mg	--	--	--	1	1 1/2	2	2 1/2	3	4	tabs
Comprimidos de 325 mg para adultos	--	--	--	--	--	1	1	1 1/2	2	tabs
Comprimidos de 500 mg para adultos	--	--	--	--	--	--	--	1	1	tabs

Indicaciones: Tratamiento de fiebre y dolor.

Notas del cuadro:

- **LÍMITE DE EDAD:** No se debe usar con bebés de menos de 12 semanas de edad (Motivo: la fiebre durante las primeras 12 semanas de vida debe ser documentada en un ambiente médico y si aparece, su bebé debe recibir una evaluación completa). **EXCEPCIÓN:** Fiebre por vacunación si un niño tiene 8 semanas de edad o más. No use fármacos con varios ingredientes con niños menores de 6 años de edad. (Motivo: recomendaciones de 1/2008 de la FDA).
- **DOSIFICACIÓN:** Se determina en base al peso del niño que aparece en la fila superior del cuadro con las dosis.
- **MEDICIÓN DE LAS DOSIS:** Las jeringas y los goteros son más precisos que las cucharaditas. Si es posible, use la jeringa o gotero que viene con el medicamento. Si no lo es, en las farmacias venden jeringas para administración de medicamentos. Si usa una cucharita, debe ser una cuchara medidora. Las cucharas comunes no son confiables. Además, recuerde que 1 cucharadita equivale a 5 ml y que 1/2 cucharadita equivale a 2.5 ml.
- **FRECUENCIA:** Repetir cada 4 a 6 horas según sea necesario. **NO** se debe usar más de 5 veces al día.
- **DOSIFICACIÓN PARA ADULTOS:** 650 mg **MÁXIMO:** 3000 mg en un periodo de 24 horas.
- **MARCAS:** Tylenol, FEVERALL (supositorios), acetaminofén genérico
- **COMPRIMIDOS SOLUBLES:** Comprimidos solubles en presentaciones de 80 mg y 160 mg (dosis juvenil)
- **SUPOSITORIOS:** El acetaminofén también se presenta como supositorios de 80, 120, 325 y 650 mg (la dosis rectal es la misma que la dosis administrada por vía oral).
- **LIBERACIÓN PROLONGADA:** No les dé a los niños fármacos por vía oral de 650 mg (Motivo: tienen liberación prolongada cada 8 horas)